

	A	B
1	Doğum Sonrası - GÜVE	
2	3. Doğumdan hemen sonra (ilk 1 saat içinde)	
3	Annede anormal kanama var mı?	Kanamamanın 500ml üstü olduğu veya kanamanın 250ml üstü ve annede aneminin mevcut olduğu durumlarda: Uterus'a masaj uygulayın. İlave uteronikleri dikkate alın, IV damar yolu açın, tedaviye başlayın.
4	☐ Hayır	
5	☐ Evet	
6	Anne için ilaç kullanımı gerekiyor mu?	
7	Antibiyotik?	
8	☐ Hayır	Plasentanın manuel olarak çıkarıldığı ve vücut sıcaklığının 38°C üzerinde olduğu, üşüme, kötü kokulu vajinal akıntı durumlarında anneye antibiyotik veriniz.
9	☐ Evet, verildi	
10	Magnezyum sülfat?	
11	☐ Hayır	
12	☐ Evet, verildi	
13		Şu durumlarda anneye magnezyum sülfat veriniz. Diastolik kan basıncının 110mmHg ve üzeri ve proteinürinin 3 ve üstü. Diastolik kan basıncının 90mmHg ve üzeri ve proteinürinin 2 ve üstü.
14	Bebeğin sevgi gerekiyor mu?	
15	☐ Hayır ☐ Evet, planlandı.	
16	Bebek için ilaç kullanımı gerekiyor mu?	
17	Antibiyotik?	
18	☐ Hayır	Anneye antibiyotik uygulamasının yapıldığı, Solunum çok hızlı (dakikada 60 üstü) veya çok düşük (dakikada 30 altında) olduğu, Göğüste hırıltı sesinin, konvülsiyonların olduğu, Hareket veya uyarının görülmediği durumlarda, Vücut sıcaklığı ısıtma sonrasında 35°C'nin üstüne çıkmıyorsa veya 38°C'nin üstündeyse antibiyotik veriniz.
19	☐ Evet, verildi	
20		
21	Antiretroviral?	
22	☐ Hayır	
23	☐ Evet, verildi.	Annenin HIV+ olduğu durumda antiretroviral veriniz.

C	D
---	---

NLİ DOĞUM - KONTOL LİSTESİ

4.Taburculuk Öncesinde

Anne kanaması kontrol altına alındı mı?

- ☐ Hayır(Tedavi edin ve taburcuğu erteleyin.)
- ☐ Evet

Anne için ilaç kullanımı gerekiyor mu?

Antibiyotik?

- ☐ Hayır
- ☐ Evet(İlaç verin ve taburcuğu erteleyin)

Bebek için ilaç kullanımı gerekiyor mu?

Antibiyotik?

- ☐ Hayır
- ☐ Evet: Antibiyotik verin, taburcuğu erteleyin, özel bakım sağlayın.

Bebek iyi besleniyor mu?

- ☐ Evet
- ☐ Hayır(Yardım edin ve taburcuğu erteleyin.)

Anneye aile planlama seçeneklerinin sunulması gerekiyor mu?

- ☐ Evet, bilgilendirme yapıldı.
- ☐ Hayır

Doğum sonrası için takip ayarlanması gerekiyor mu?

Vücut sıcaklığının 38°C üzerinde olduğu, üşüme,kötü kokulu vajinal akıntı durumlarında anneye antibiyotik veriniz.

Solunum çok hızlı (dakikada 60 üstü) veya çok düşük (dakikada 30 altında)olduğu,
Göğüste hırıltı sesinin, konvülsiyonların olduğu,
hareket veya uyarana cevap verilmeyen durumlarda,
Vücut sıcaklığı ısıtma sonrasında 35 °C'nin üstüne çıkmıyorsa veya 38°C'nin üstünde olduğu,
Emmeyi kestiği,
Göbek bağının çevresinin cilde doğru kırmızılaşması durumlarında bebeğe antibiyotik veriniz.

24	
25	Bebeğin özel bakım veya takibe ihtiyacı var mı?
26	☐ Hayır ☐ Evet, planlandı.
27	☐ Emzirme ve cilt temasına başlandı.(Anne ve bebeğin sağlık durumları iyiye)
28	☐ Anne veya refakatçının doğumda tehlikeli bir durum karşısında yardım çağıracağı onaylandı. Formu Dolduranın Adı Soyadı
29	Bebeğin normal süreden 1 aydan fazla süre erken doğduğu, doğum ağırlığının 2500 gramdan az olduğu, antibiyotik kullanımının gerektiği, resüsitasyona ihtiyaç duyulan durumlarda takip ediniz. Annenin kanama, ciddi abdominal ağrı, şiddetli baş ağrısı, görüş bozukluğu, nefes almada güçlük durumlarında, bebeğin hızlı veya zor nefes alması, ateş, normal dışı soğukluk, beslenmeyi kesmesi, hareketlerde azalma veya tüm vücudun sarı olduğu durumlarda.
30	Form Kod No:DH-DKF-04
31	Rev No:00/Rev. Tar:....

☐ Evet, planlama yapıldı.

☐ Hayır

**Anne veya refakatçısı yardım çağırması gerektiği durumlar
konusunda bilgilendirildi mi?**

☐ Evet, planlama yapıldı.

☐ Hayır

Formu Dolduranın Adı Soyadı:

Annenin kanama, ciddi abdominal ağrı şiddetli baş ağrısı, görüş bozukluğu, nefes almada güçlük, ateş, titreme veya defekasyonda güçlük durumlarında, Bebeğin hızlı veya zor nefes alması, ateş, normal dışı soğukluk, beslenmeyi kesmesi, hareketlerde azalma veya tüm vücudun serildiği durumlarda