

DİAZEPAM KULLANIM ŞEMASI (SOLUNUM DEPRESSE İSE YAPILMAMALI)

Yükleme dozu: 10 mg. Diazepam IV yoldan yavaşça 2 dakikada verilir. Eğer konvülsiyon tekrarlırsa yükleme dozu yeniden verilir.

İdame dozu: 40 mg. Diazepam'ın 500 ml IV sıvı (normal salin veya ringer laktat) içinde 12 saatte verilmesi hastayı uyanık ama sakin tutar. 24 saat içinde 100 mg'dan fazla verilmemelidir.

Antihipertansif İlaçlar

10 mg. Nifedipin kapsül oral olarak yutturulur. Kan basıncı düşene kadar her 30 dakikada bir tekrarlanır. Ancak maksimum 5 uygulamadan (50 mg.) sonra halen başarılı olunmazsa başka bir tedavi seçeneği düşünülmelidir.

Nifedipinin etkili olmadığı olgularda Sodyum nitroprussid 0,25 mcg/kg/ dakika IV infüzyon şeklinde başla. Bu tedavi sırasında kan basıncını 10 dakikada bir izle. Diastolik basınç 90 mmHg altına düştüğü durumlarda Sodyum nitroprussid'i sonlandır ve hastayı izle. Tansiyon tekrar yükselirse yarı dozda Sodyum nitroprussid uygulamasına devam et. Eğer başlangıç dozu 5 mcg/kg/dakika ise Diastolik basınç 90 mmHg altına düştüğü durumlarda Sodyum nitroprussid'i azaltarak sonlandır ve hastayı izle. Yan etkileri fazla olan tehlikeli ve uygulanması dikkat isteyen bir tedavidir.

Bu tedavilerle kan basıncı kontrolü sağlanamayan hastalarda patenteral antihipertansif tedavi alternatiflerinin uygulanması için kardiyoloji veya dahiliye konsültasyonu istenebilir.

Nifedipin ile MgSO₄'ün beraber kullanımında ani hipotansiyon açısından dikkatli olunmalıdır.