

HASTANIN ADI SOYADI:		TIBBİ TANIS:		PROTOKOL:		TARİH/SAAT													
HEMŞİRELİK TANISI (MEVCUT/OLASI PROBLEMLERİ)	HEDEF/AMÇ (BEKLENEN SONUÇ)	HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ				8:30 18	18 8:30	8:30 18	18 8:30	8:30 18	18 8:30	8:30 18	18 8:30	8:30 18	18 8:30	8:30 18	18 8:30		
Deri Bütünlüğünde Bozulma Riski ☐ Hastalıklar ☐ Flaster,prop ☐ Pansuman materyallerine bağlı ☐ İnvaziv girişimler ☐ Prematürelilik ☐ Konjenital anomoliler	Deri bütünlüğünü sağlanması	Her 3 saatte bir pozisyon değiştirilecek. Pozisyon değişikliklerinde kulakların katlanması,yapışması önlenir. Ekstremiteler bebek çarşafı ve yastıklarile desteklenir.																	
		EKG elektrotları meme dokusu üzerine yapıştırılamaz																	
		SPO2 ve ısıprobunun yeri 3 saatte bir değiştirilir.																	
		Batikon ile işlem yapılmış ise cilt distile su ile temizlenir.																	
		Ciltte ve dudaklarında kuruluk,kızarıklık,çatlama gözlenerek bakımı yapılır.																	
		Nasal CPAP,OGS,NGS,Entübasyon uygulanıyor ise burun mukozası,tespit bölgeleri;kızarıklık,kanama, ödem açısından gözlenecek gerekirse doktor istemi ile pomat uygulanır (ogs-ngs-n.cpap flaster yerleri ve ETT flaster yeri 24 saat ara ile değiştirilecek.)																	
		Gereksiz flaster kullanımı engellenecek,kullanımı gerektiğinde yenidoğan cildine uygun materyal seçilerek en az alanı örtecek miktar kullanılır.(şeffaf yara örtüsü, comfell v.s)																	
		Oral kavitede günde 4 kez kontrol edilecek. Anne sütü (kolostrum) ile ağız bakımı yapılır.																	
-Göbeğin temiz ve kuru olması sağlanır.																			

OPTİMED HASTANESİ YENİDOĞAN DERİ
BÜTÜNLÜĞÜNDE BOZULMA RİSKİ BAKIM PLANI
FORMU

Deri Bütünlüğünde Bozulma Riski (Devam)		TARİH														
		SAAT	8:30 18	18 8:30	8:30 18	18 8:30	8:30 18	18 8:30	8:30 18	18 8:30	8:30 18	18 8:30	8:30 18	18 8:30	8:30 18	18 8:30
		Pişik olmaması için 3 saat ara ve gerektiğinde bebeğin altı değiştirilir,bezi çok sıkı bağlanmaz,perine bölgesi kızarıklık açısından gözlemlenir,alkol içermeyen, su emdirilmiş temizleyici mendiller kullanılarak temizliği sağlanır.														
		Term bebeklerin düzenli banyo sayısı haftada 2-3kez prematüre bebeklerde ventilatör bağlı ve kateteri var ise hergün silme banyosu yapılarak ve bebek yağı ya da losyonu ile yağlanmalıdır.														

DEĞERLENDİRME

TARİH...../...../.....	TARİH...../...../.....	TARİH...../...../.....	TARİH...../...../.....	TARİH...../...../.....	TARİH...../...../.....	TARİH/...../.....
8:30-18 ☐ Sorun giderildi ☐ Sorun Kısmen Giderildi ☐ Sorun Giderilemedi Not:	8:30-18 ☐ Sorun giderildi ☐ Sorun Kısmen Giderildi ☐ Sorun Giderilemedi Not:	8:30-18 ☐ Sorun giderildi ☐ Sorun Kısmen Giderildi ☐ Sorun Giderilemedi Not:	8:30-18 ☐ Sorun giderildi ☐ Sorun Kısmen Giderildi ☐ Sorun Giderilemedi Not:	8:30-18 ☐ Sorun giderildi ☐ Sorun Kısmen Giderildi ☐ Sorun Giderilemedi Not:	8:30-18 ☐ Sorun giderildi ☐ Sorun Kısmen Giderildi ☐ Sorun Giderilemedi Not:	8:30-18 ☐ Sorun giderildi ☐ Sorun Kısmen Giderildi ☐ Sorun Giderilemedi Not:
Hemşire:	Hemşire:	Hemşire:	Hemşire:	Hemşire:	Hemşire:	Hemşire:
18-8:30 ☐ Sorun giderildi ☐ Sorun Kısmen Giderildi ☐ Sorun Giderilemedi Not:	18-8:30 ☐ Sorun giderildi ☐ Sorun Kısmen Giderildi ☐ Sorun Giderilemedi Not:	18-8:30 ☐ Sorun giderildi ☐ Sorun Kısmen Giderildi ☐ Sorun Giderilemedi Not:	18-8:30 ☐ Sorun giderildi ☐ Sorun Kısmen Giderildi ☐ Sorun Giderilemedi Not:	18-8:30 ☐ Sorun giderildi ☐ Sorun Kısmen Giderildi ☐ Sorun Giderilemedi Not:	18-8:30 ☐ Sorun giderildi ☐ Sorun Kısmen Giderildi ☐ Sorun Giderilemedi Not:	18-8:30 ☐ Sorun giderildi ☐ Sorun Kısmen Giderildi ☐ Sorun Giderilemedi Not:
Hemşire:	Hemşire:	Hemşire:	Hemşire:	Hemşire:	Hemşire:	Hemşire:

