

**KALİTE SİSTEM DOKÜMANLARI****KULLANILMAMASI
GEREKEN KISALTMA VE SEMBOL LİSTESİ**

Dok. No: İY-LS-06

Yayın Tarihi: 01.03.2009

GG Tarihi: 28.07.2020-07

Revizyon No: 01

Revizyon Tarihi: 28.07.2020

KULLANILMAMASI GEREKEN KISALTMALAR VE SEMBOLLER	ANLAMI	DOĞRU KULLANIM	OLUŞABİLECEK HATALAR
ASA	Asetil salisilik asit	İlacın ismi tam olarak yazılmalıdır	Anestezi değerlendirme testi ile karışabilir
KCL	Potasyum Klorür ampul	İlacın ismi tam olarak yazılmalıdır	HCL ile karışabilir
MS, MSO4	Morfin sülfat	İlacın ismi tam olarak yazılmalıdır	Magnezyum sülfat ile karıştırılabilir
MgSO4	Magnezyum sülfat	İlacın ismi tam olarak yazılmalıdır	Morfin sülfat ile karıştırılabilir
s.g	Suda glikoz	İlacın ismi tam olarak yazılmalıdır	Konsantrasyon karışıklığına neden olabilir
s.s	Serum Sale	İlacın ismi tam olarak yazılmalıdır	Yüksek risk gurubundaki ilaçtır ve '55' ile karışabilir.
IU	Uluslararası ünite	Uluslar arası ünite ya da ünite yazılmalıdır	IV (intravenöz) ya da '10' ile karıştırılabilir
U veya u	Ünite	Ünite kullanılmalıdır	"0" veya "4" rakamları ile karıştırılabilir
µg	Mikrogram	'mcg' ya da 'mikrogram' yazılmalıdır	mg ile karıştırılabilir
D5	%5 Dekstroz	İlacın ismi tam olarak yazılmalıdır	Konsantrasyon karışıklığına neden olabilir

	KALİTE SİSTEM DOKÜMANLARI	Dok. No: İY-LS-06
	KULLANILMAMASI GEREKEN KISALTMA VE SEMBOL LİSTESİ	Yayın Tarihi: 01.03.2009 GG Tarihi: 28.07.2020-07 Revizyon No: 01 Revizyon Tarihi: 28.07.2020

KULLANILMAMASI GEREKEN KISALTMALAR VE SEMBOLLER	ANLAMI	DOĞRU KULLANIM	OLUŞABİLECEK HATALAR
1.0 mg	1 mg	1 mg olarak yazılmalıdır.	1.0 mg,10 mg olarak algılanabilir
.5 mg	0.5 mg	0.5 mg olarak yazılmalıdır.	Nokta görülmediğinde .5 mg, 5mg olarak anlaşılabilir
cc	Santimetre küp	'ml' veya 'mililitre' olarak yazılmalıdır.	'0' rakamı ya da 'U' (Ünite) ile karışabilir.
SC	Subkütan	'subkütan' ya da 'cilt altı' yazılmalıdır.	SL ile karışabilir.
10mg veya 100ml	10 mg ve 100 ml	Doz ve kısaltma ayrı yazılmalıdır.	Birleşik yazılan 'm', '0' ile karışabilir.
10000 ünite, 100000 ünite	10.000 ünite, 100.000 ünite	Nokta ayrıçlı format ya da 10 bin, 100 bin olarak yazılmalıdır.	Fazla veya eksik '0'okunması doz hatasına neden olabilir.
x	Yanlış	Taraf işaretlemede sadece hasta ad soyad baş harfleri kullanılmalıdır.	Taraf işaretlemede 'bu taraf' ya da 'bu taraf değil' olarak anlaşılabilir.
&	ve	've' yazılmalıdır.	'2' ile karışabilir.

ISMP List of Error – Prone Abbreviations, Symbols, and Dose Designations (02.10.2017) dokümanından yararlanılmıştır.