

OBRAZAC INFORMISANOG PRISTANKA ZA NOVU INFEKCIJU KORONAVIRUSOM (COVID-19)**(KORISTIĆE SE KAO DODATNA DRUGIM OBRAZACIMA SAGLASNOSTI)**

Naši pacijenti povezani sa novom infekcijom koronavirusom (COVID-19) primaju stacionarno i ambulantno lečenje u jedinicama rezervisanim za njih. Želimo da podelimo da, pošto je prenos nove infekcije koronavirusom veoma visok, a vi ste u bolničkom okruženju, može postojati rizik od prenošenja novog koronavirusa (COVID-19), čak i ako je nizak.

Čak i ako trenutno nema simptoma, nova infekcija koronavirusom (COVID-19) može postati aktivna nakon operacije / bolničkog / ambulantnog lečenja, Moj lekar je obavešten o mogućim situacijama (groznica, kašalj, otežano disanje, simptomi gripa, otkazivanje organa i sistema, respiratorna insuficijencija, smrt) koje se mogu javiti u slučaju infekcije.

Ovo stanje nije moguće otkriti pod sledećim uslovima, čak i ako se uradi test, bolest se ne može otkriti u periodu inkubacije, a doktor je meni/mojem pacijentu dao izjavu o karantinu i izolaciji.

U slučaju da se kriterijumi za prijem pacijenata navedeni u vodiču za lečenje koje je objavilo Ministarstvo zdravlja razvije dok se lečite od infekcije novim koronavirusom (COVID-19) u klinici. Za pacijente koji ispunjavaju ove kriterijume potrebna je konsultacija anesteziologa. U slučajevima kada nema mesta na odeljenju intenzivne nege, 112 se može obratiti i premestiti u drugu ustanovu.

Nakon ove informacije, izričito izjavljujem i prihvatam da budem hospitalizovan radi operacije/bolničkog/ambulantnog lečenja.

Pacijent/Rođaci pacijenata;

Ime i prezime:

Datum vreme:

Potpis:

lekar;

Ime i prezime:

Datum vreme:

Potpis:

SLEDEĆI DEO MOŽE DA PRENETE IZ BLIŽINE KO ŽELI DA OSTANE KOMPANIJA

To je najzdravije za našeg pacijenta i za vas i želimo da radije ne ostanete u bolnici kao pratilac. Moguće situacije u kojima je infekcija novim koronavirusom (COVID-19) u obliku epidemije i njena zaraznost je visoka i može se javiti u slučaju prenošenja. Date su informacije o (groznica, kašalj, kratak dah, simptomi gripa, otkazivanje organa i sistema, respiratorna insuficijencija, smrt). Obavešten sam da će se obezbediti uslovi izolacije mog rođaka i da će se nastaviti sa praćenjem i lečenjem.

Ako ostanete kao pratilac;

Ruke treba redovno prati sapunom i vodom u trajanju od najmanje 30 sekundi, a dezinfekciono sredstvo za ruke treba koristiti kada nije moguće oprati ruke. Socijalno distanciranje treba poštovati u svim okolnostima. Treba voditi računa o pravilnoj upotrebi maske.

Uprkos svim upozorenjima, dobrovoljno prihvatam i odobravam da ostanem sa pacijentom kao pratilac.

U pratnji:

Potpis: