

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No : EN-TL- 03
	MRSA'DA İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI	Yayın Tarihi :01.07.2009 Revizyon No :01 Revizyon Tar.:04.04.2011 Sayfa No :1/3

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
01	Kimlik tanımlayıcı değişikliği, ilavesi.		04.04.2011	Eğt. Hem. Melek KAYA
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi. Son Gözden Geçirme:21.04.2019-10	Tüm sayfalar	02.03.2020	Eğitim Enfeksiyon Hemşiresi Ece Nur Topcu
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi.	Tüm sayfalar	05.03.2023	Ece Nur TOPCU Eğitim ve Enfeksiyon Hemşiresi

HAZIRLAYAN	KALİTE SİSTEM ONAYI	ONAY
ENFEKSİYONLARIN KONTROLÜ VE ÖNLENMESİ KURULU BAŞKANI	KALİTE YÖNETİCİSİ	BAŞHEKİM

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No : EN-TL- 03 Yayın Tarihi :01.07.2009
	MRSA'DA İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI	Revizyon No :01 Revizyon Tar.:04.04.2011 Sayfa No :2/3

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı Optimed Hastanesinde, Hastanede ortaya çıkabilecek MRSA enfeksiyonları önlemek için gerekli kontrol önlemlerini belirlemek, olası salgınları kontrol altına almaktır.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

OH : Optimed Hastanesi

MRSA :Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus

3. REFERANS DOKÜMANLAR

İzolasyon Önlemleri Talimatı

Eldiven Giyme ve El Yıkama Talimatı

Hastane Temizliği Prosedürü

Dezenfektan Kullanım Listesi

İzolasyon Uygulama Takip Formu

4. UYGULAMA:

- Yoğun bakımlarda bir aydan uzun süre yatan hastalarda veya başka amaçla alınan kültürlerde MRSA (Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus) üremesi durumunda Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi Kuruluna ve ilgili klinik ve hastanede bu konuyla ilgili olabilecek tüm personel bilgilendirilir.
- MRSA saptanması veya şüphelenilmesi durumunda İzolasyon Önlemleri Talimatına göre temas izolasyonu uygulanır.Hasta özel İzolasyon Odasına alınır. Eğer ilgili bölüm dolu ise hasta tek kişilik bir odaya alınabilir (Eğer çok sayıda aynı durumda hasta varsa MRSA saptananlar aynı odada yatırılabilir.)
- Hastaya özel stetoskop, tansiyon aleti, termometre vs. malzemeler bulundurulur, eğer bu aletlerin/ malzemelerin dışarıya çıkışı gerekiyorsa dezenfekte edilir.
- Odaya girişte önlük giyilir ve önlüğün odada kalması sağlanır.
- Hasta odasına girişte-çıkışta eller alkol bazlı el dezenfektanı ile dezenfekte edilir.
- Hasta ve enfekte materyal ile temasta eldiven (steril olmayan) giyilir, odadan çıkmadan eldiven çıkartılır ve eller Eldiven Giyme ve El Yıkama Talimatına göre yıkanır.
- MRSA ile enfekte hastanın transferi söz konusu olursa, hastanın lezyonları varsa kapatılır, hasta taşıyan kişiler önlük giyilir. İlgili servis veya kurum önceden bilgilendirilmelidir. Transfer edilen araç transferden sonra dezenfekte edilir.
- Bir klinikte 2-3 hasta MRSA ile enfekte ise, diğer hastalar ve personelden burun ve el kültürleri alınarak taşıyıcılar belirlenmelidir.
- Odaların temizliğine dikkat edilir ve Hastane Temizliği Prosedürü ve ilgili bölüm temizlik talimatına uygun olarak temizlik işlemleri yapılır.
- Dezenfeksiyon işlemi yapılırken Dezenfektan Kullanım Listesinde belirtilen dezenfektan , listede belirtilen miktarda uygun dezenfektan kullanılır.
- Hastanın çamaşırları, diğer çamaşırlardan ayrı olarak toplanılır, diğer çamaşırlarla karıştırılmaz, temizlik görevlisine ve çamaşırlaneye ayrıca belirtilir.

OPTİMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No : EN-TL- 03 Yayın Tarihi :01.07.2009
	MRSA'DA İZOLASYON ÖNLEMLERİ TALİMATI	Revizyon No :01 Revizyon Tar.:04.04.2011 Sayfa No :3/3

- Önlem olarak MRSA' da izolasyonu gerektiren hastanın odasının kapısına temas izolasyonu tanımlayıcısı(kırmızı üçgen) konulur. Bunun dışında hastanın odasına bilgilendirici bir yazı vb. konulmaz.



Temas İzolasyonu Tanımlayıcısı

- MRSA ile enfekte ya da kolonize olduğu saptanan tüm hastaların 10-14 gün boyunca klorheksidin, povidon iyod gibi antiseptik solüsyonlar ile günlük banyo yapmaları veya duş almaları sağlanmalıdır.
- Hasta banyodayken hastanın yatağı, yemek masası, dolabı dezenfektan solüsyonlarla silinmeli, çarşafı değiştirilmelidir.
- Dermatitli hastalarda antiseptik solusyonlar dikkatli kullanılmalı, irritasyon gelişmesi halinde kesilmelidir.
- Tarama kültürleri burun sürüntü kültürü alınarak yapılır. MRSA üremiş olan hastalardan kurulun belirleyeceği sıklıkta kontrol kültürleri alınmalıdır. Arka arkaya üç negatif kültür sonucu alınınca izolasyona son verilir.
- Hastane Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi Kurulu gerekli görürse tüm hastalardan ve çalışanlardan tarama kültürleri yapabilir.
- Kan ve idrar kültürleri sadece daha önceden MRSA ürediyse tekrarlanmalıdır.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından Enfeksiyon Hemşiresi ve Enfeksiyonların Kontrolü ve Önlenmesi Kurulu sorumludur.