

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No : HB-TL-27 Yayın Tarihi :01.09.2009 Revizyon No :02 Revizyon Tar.:25.09.2019 Sayfa No :1/3
	NAZOGASTRİK SONDA KULLANMA TALİMATI	

Revizyon No	Yapılan Revizyon	Rev. Sayfası	Revizyon Tarihi	Revizyonu Yapan
01	Kullanılacak malzemeler eklendi.		27.12.2010	Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Bilge DEV
02	Uygulama kısmına uzun süre nazogastrik sonda ile beslenecek olan hastalarla ilgili ekleme yapıldı.		25.09.2019	Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Ece Nur TOPCU
Gözden Geçirme	Gözden geçirildi	Tüm sayfalar	30.09.2022	Eğitim ve Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi Ece Nur TOPCU
HAZIRLAYAN		KALİTE SİSTEM ONAYI		ONAY
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ DİREKTÖRÜ		KALİTE YÖNETİCİSİ		BAŞHEKİM

1. AMAÇ VE KAPSAM

OPTİMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No : HB-TL-27 Yayın Tarihi :01.09.2009 Revizyon No :02 Revizyon Tar.:25.09.2019 Sayfa No :2/3
	NAZOGASTRİK SONDA KULLANMA TALİMATI	

Bu talimatın amacı, Nazogastrik sonda takma işlemini, tespit edilmesini, NG ile besleme yapılması, NG ile gastrik drenaj yapılması ve NG sondanın çıkarılmasını ve bu işlemlerin doğru yapılmasını sağlamaktır.Hasta bakım sürecini kapsar.

2. TANIMLAR VE KISALTMALAR

3. REFERANS DOKÜMANLAR

El Yıkama ve Eldiven Giyme Talimatı

4. UYGULAMA:

- Bu işlem sırasında kullanılacak malzemeler aşağıdakilerdir;
 - ❖ Hipoalerjik Elastik Tıbbi Flaster
 - ❖ Makas
 - ❖ Beslenme Enjektörü 50 cc
 - ❖ Steteskop
 - ❖ Gazlı Bez
 - ❖ Böbrek Kuvet
 - ❖ Non-steril eldiven
 - ❖ Catajer
 - ❖ Nazogastrik sonda hazırlanır (hastanın yaşına uygun; Çocuklarda No:6,8,10; Yetişkinlerde 12-14,16,...gibi)
- Nazogastrik sondalar kullanım kolaylığı açısından buzdolabında tutulmalıdır.
- Hastanın yaşı ve genel durumu göz önünde bulundurularak uygun sonda seçilmelidir.
- Hasta , oturur/sırt üstü yatar pozisyonda ve başı 45 derece geriye ekstansiyon pozisyonunda olmalıdır.
- Tüpü ağızdan kulak memesine ve oradan aşağıya karnın ön bölgesine kadar, tüpün son deliği ksifoid çıkıntının altında olacak şekilde ölçülür.. Bu tüpün ilerletileceği mesafeyi gösterir.
- NG sonda ucu uygun bir solüsyon ya da pomat ile kaygan duruma getirilir.
- Hastanın boynunu öne eğmesi istenir ve NG sonda yavaşça açık olan burun deliğinden sokulur. Nazal yolda ilerlerken hasta bilinçli ise yutkunması söylenir, NG sonda nazofarenksin arkasına doğru ilerletilir.
- Tüp nazofarenksten geçince, hasta rahatça konuşup nefes alabilmelidir. Bu doğruladıktan sonra NG sonda yavaşça tahmini uzunluğu boyunca ilerletilir.
- Mideye ulaştıktan sonra Ng'nin yerinde olup olmadığı kontrol etmek için, beslenme enjektörüyle yaklaşık 20 ml hava verilip epigastrik bölge oskülte edilerek tüpün mideye doğru yerleşip yerleşmediği stetoskop ile dinlenerek kontrol edilir. Çok miktarda sıvı aspire edilmesi de tüpün mideye yerleştiğini gösterir.
- NG sondanın burun kanatlarına bası yapmamasına dikkat ederek hastanın burnuna bantlanır. Burun kanatlarında erezyon oluşmasını önlemek için NG sondaya yeterince kayganlaştırıcı sürülmelidir. NG sonda daima burundan daha aşağıda olmalı ve asla hastanın alnına bantlanmamalıdır. NG sonda bantla hastanın giysisine tutturulabilir.

OPTIMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Dok.No : HB-TL-27 Yayın Tarihi :01.09.2009 Revizyon No :02 Revizyon Tar.:25.09.2019 Sayfa No :3/3
	NAZOGASTRİK SONDA KULLANMA TALİMATI	

- Doktor istemine göre kapalı tutulur ya da serbest drenaja alınır.
- Gastrik dekompresyon ve/ veya beslenme amaçlı kullanılır.
- NG sonda ile işlem bittiğinde tespiti açılarak hastaya nefesini tutması söylenip çıkarılır.
- Hastanın el yüz bakımı verilir.
- Uzun süre nazogastrik sonda ile beslenecek olan hastalarda, sonda ayda bir diğer burun deliğinden takılacak şekilde değiştirilir (Tıkanıklık, yoğun kirlenme, burun kanatlarında basınç yarası dışında).
- İşlem öncesinde ve sonrasında eller el yıkama talimatı El Yıkama ve Eldiven Giyme Talimatı göre yıkanır, yerleştirilme ve çıkarma işlemleri steril eldivenle yapılır.

5.SORUMLULAR

Bu talimatın uygulanmasından tüm sağlık çalışanları sorumludur.