

UYANIK TRAKEAL ENTÜBASYON (UTE) TEKNIĞİ

UYANIK TRAKEAL ENTÜBASYON (UTE) TEKNIĞİ *

OKSİJENASYON

- Erken HFNO uygulayın
- HFNO'yu 30-70 L/dk. olarak ayarlayın
- İşlem boyunca HFNO'ya devam edin

İŞLEM

- Uygun trakeal tüp seçin
- Hastayı oturtun
- Hekimin monitörü ve video ekranını görebilmesini sağlayın
- Sekresyonları temizleyin
- FB kullanılacaksa;
 - Hasta ile yüz yüze olacak şekilde durun
 - Oral yol kullanılacaksa bronkoskop airway kullanın
 - Bronkoskobu posteriora yönlendirin
- VL kullanılacaksa;
 - Hastanın arkasında durun
 - Buji kullanmayı düşünün
- Anestesi indüksiyonu öncesi; iki aşamalı kontrol

TOPIKAL ANESTEZİ

- Orofarenkse, dil köküne ve tonsiller kıvrımlarına %10 lidocaine sprey uygulayın
- 20-30 sprey (inspiryum sırasında en az 5 dk)
- Nazal yol için de mevcut LA sprey kullanın
- Travmatize etmeden etkiyi kontrol edin
- Yetersiz ise ek LA maksimum doza kadar uygulayın
 - Dil tabanına ek olarak 5 sprey LA
 - 2 ml %2 lidokain (x3) FB 'un çalışma kanalından epidural katater ile aşağıya vokal kordlar üzerine ve altına püskürtün

Lidokain
%10 1 sprey(0.1 ml) = 10 mg
%2 1 ml = 2 mg

SEDASYON

- Gerekirse sedasyon uygulayın
- Remifentanil infüzyon (TCI - Ce 1-0-3.0 ng-ml¹)
- İkinci kişi varlığında midazolam 0.5-1 mg uygulamayı düşünün

HFNO - Yüksek frekanslı nazal oksijen, FB - Fleksibl bronkoskop, VL - Videolaringoskop,
LA - lokal anestezi, TCI - Hedef kontrollü infüzyon, Ce - Etkin konsantrasyon