

Kilo :	Boy :	Vücut Yüzey Alanı :	Yasaklı Kol: Sağ Sol		
TEDAVİ PLANI					
Protokol İlaçları		Dozu /m ²	Uygulama Günleri		
Pembrolizumab 200 mg			1. gün /21 günde bir		
Paklitaksel 175mg /m ²			1. gün /21 günde bir		
Sisplatin 50 mg /m ²			1. gün/21 günde bir		
Bevacizumab 15 mg / kg					
ANTİNEOPLASTİK, ANTİEMETİK VE HİDRASYON İLAÇLARI					
1- 100 cc sf içine 8 mg Dekort+ Avil-panto-Emetril konarak 15 -20 dakika verilecek.					
2- 100 cc sf içine Pembrolizumab konarak (ilk doz 90 dk daha sonra 30-60 dk'da) verilecek.					
3- 500 cc sf (PVC içermeyen infüzyon torbası veya cam şişe) içine paklitaksel konarak 3 saatte verilecek.					
4- 1000 cc sf içine 1 ampul MgSO ₄ ve 1 ampul KCl konarak 1 saatte iv verilecek.					
5- 1000 cc sf içine sisplatin konarak 1 saatte iv verilecek. (Işık korumalı infüzyon torbası ve seti kullanılır.)					
6- 100 cc sf içine Bevacizumab konarak 30 dk verilecek.					
Kemoterapi başlamadan 30 dakika önce aprepitant tablet yutulacak. Aprepitant tablet 2. ve 3. gün de devam edilecek.					
İLAÇLAR	 KÜR	 KÜR	 KÜR	 KÜR	 KÜR
Tarih					
Pembrolizumab					
Paklitaksel					
Sisplatin					
Bevacizumab					
Hekim isim / kaşe / imza					
İLAÇLAR	 KÜR	 KÜR	KÜR	 KÜR	 KÜR
Tarih					
Pembrolizumab					
Paklitaksel					
Sisplatin					
Bevacizumab					
Hekim isim / kaşe / imza					