

OPTİMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :KT-ŞM-03 Yayın Tarihi :15.04.2024 Revizyon No :00 Revizyon Tar.: Sayfa No :1/1
	BEP KEMOTERAPİ ŞEMASI	

Hasta Adı Soyadı :			Protokol No :		
Protokole Başlama Tarihi :			Poliklinik No :		
Kilo :	Boy :	Vücut Yüzey Alanı :	Yasaklı Kol: Sağ	Sol	Port ☐ Var ☐ Yok
Tanı :		Evre:	Histoloji :		
Alerji : ☐		Diabet : ☐	Hipertansiyon: ☐	Süre : 2 - 4 saat	

TEDAVİ PLANI

Adjuvan : ☐	Neoadjuvan : ☐	Palyatif : ☐	Eş zamanlı : ☐	Primer: ☐
Protokol İlaçları	Dozu /m ²	Uygulama Günleri	Kür Aralığı	
Bleomisin 30 mg		1 ; 8 ; 15 gün	21 gün	
Sisplatin 20mg /m ²		1-5 gün	21 gün	
Etoposid 100mg /m ²		1-5 gün	21 gün	

ANTİNEOPLASTİK, ANTİEMETİK VE HİDRASYON İLAÇLARI

	1	2-5
1- 100 cc NaCl içine 8 mg deksametazon avil- panto-emetril konarak 15 -20 dakika verilecek.	+	+
2- Fosemazon 150mg SF150 ml içinde 20 dakikada inf. veya EMEND TB.	+	-
3- BLEOMİSİN SF 250 ml içinde 15-30 dakikada inf.	+	-
4- 1000 cc izotonik NaCl içine 4-2ampul MgSO4 + 2 ampül KCL konarak 2 saatte iv verilecek.	+	+
5- 100 cc izotonik NaCl ile damar yolu yıkanacak.	+	+
6- 1000 cc izotonik NaCl içine sisplatin konarak 2 saatte iv verilecek.(Işık korumalı infüzyon torbası ve seti kullanılır.)	+	+
7- 100 cc izotonik NaCl ile damar yolu yıkanacak.	-	-
8- 250 cc izotonik NaCl içine Etoposid konarak 30 dakikada iv verilecek.		
9- 100 cc izotonikle damar yolu yıkanır.		

Hastanın Kullanacağı Destek Tedaviler

Aprepitant 1 gün 125 mg 2.ve3.günler 80 mg kullanacak.

İLAÇLAR	KÜR				KÜR			
	1. Gün	2-5 Gün	8. Gün	15. Gün	1. Gün	2-5 Gün	8. Gün	15. Gün
Tarih								
Kilo / m ²								
Bleomisin								
Sisplatin								
Etoposid								
Destek Tedavi								
Hekim isim / kaşe / imza								
Eczacı	1	2 3 4 5	8	15	1	2 3 4 5	8	15
Hemşire	1	2 3 4 5	8	15	1	2 3 4 5	8	15