

OPTIMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : KT-ŞM-15 Yayın Tarihi :15.04.2024 Revizyon No :00 Revizyon Tar.: Sayfa No :1/2
	DOSETAKSEL – DOKSORUBİSİN – SİKLOFOSFAMİD (TAC) KEMOTERAPİ ŞEMASI	

Hasta Adı Soyadı :		Protokol No :		
Protokole Başlama Tarihi :		Poliklinik No :		
Kilo :	Boy :	Vücut Yüzey Alanı :	Yasaklı Kol: Sağ Sol	
Tanı :	Evre:	Histoloji :		
Alerji : ☐	Diabet : ☐	Hipertansiyon: ☐	Süre: 2 - 4 saat	
TEDAVİ PLANI				
Adjuvan : ☐	Neoadjuvan : ☐	Palyatif : ☐	Eş zamanlı : ☐	
Protokol İlaçları	Dozu /m ²	Uygulama Günleri		
Dosetaksel 75 mg / m ²		1. gün		
Doksorubisin 50 mg / m ²		1. gün		
Siklofosfamid 500 mg / m ²		1. gün		
ANTİNEOPLASTİK, ANTİEMETİK VE HİDRASYON İLAÇLARI				
1- 100 cc izotonik NaCl içine 16 mg deksametazon + panto + avil + aloxi konarak 10 dakikada i.v 2- 150 cc izotonik NaCl içine 1 ampul Fosemazon konularak 20 dakikada iv verilecek veya EMEND 3- 250-500 cc izotonik NaCl (PVC içermeyen infüzyon torbası veya cam şişe) içine Dosetaksel eklenerek 1 saatte iv verilecektir (dosetaksel 0.3-0.74 mg / ml konsantrasyon aralığında olmalı) 4- 100 cc sf ile damar yolu yıkanır 5-100 cc izotonik NaCl içine Doksorubisin eklenerek 10-15dakika iv serbest infuzyon. 6-100 cc izotonik NaCl ile damar yolu yıkanacak. 7- 250-500 cc izotonik NaCl içine siklofosfamid eklenerek 30-60 dakikada iv verilecek. 8- 100 cc izotonik NaCl ile damar yolu yıkanacak.				
HASTANIN KULLANACAĞI TEDAVİLER				
- Tedavinizden 1 gün önce : Akşam 1 tane - Tedavi günü : Akşam 1 tane - Tedaviden sonraki 1. gün : Sabah 1 tane - Tedaviden sonraki 2. gün : Sabah 1 tane - Tedaviden sonra 48.saatte başlamak üzere , Filgrastim veya lenograstimgün süreyle günde 1 tane sc (koldan cilt altına) uygulanmalıdır.		KORDEXA 8 mg tb ağızdan alınacak veya DEKORT veya ONADRON 8 mg AMP IM (kalçadan) olarak yapılacaktır.		
İLAÇLAR	 KÜR	 KÜR	 KÜR	 KÜR
Tarih				
Kilo / m ²				
Dosetaksel				

Doksorubisin

Siklofosfamid

Destek Tedavi

Hekim isim / kaşe / imza

Eczacı

Hemşire