

OPTIMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No : KT-ŞM-46
	PAKLİTAKSEL – CİSPLATİN KEMOTERAPİ ŞEMASI	Yayın Tarihi :15.04.2024 Revizyon No :00 Revizyon Tar.: Sayfa No : 1/1

Hasta Adı Soyadı:			Protokol No:		
Protokole Başlama Tarihi:			Poliklinik No:		
Kilo:	Boy:	Vücut Yüzey Alanı:	Yasaklı Kol:	Sağ	Sol
Tanı:		Evre:	Histoloji :		
Alerji: ☐		Diabet: ☐	Hipertansiyon: ☐	Süre > 4 saat	

TEDAVİ PLANI					
Adjüvan : ☐		Neoadjüvan : ☐		Palyatif : ☐	Eş zamanlı : ☐
Protokol İlaçları		Dozu /m ²		Uygulama Günleri	
Paklitaksel 175 mg /m ²				1. gün	
Sisplatin 75-80 mg /m ²				1. gün	

ANTİNEOPLASTİK, ANTİEMETİK VE HİDRASYON İLAÇLARI					
1. 100 cc izotonik NaCl içine 16 mg deksametazon konarak 10 dakikada iv verilecek, settenmgiv yapılacaktır.					
2. 100 cc izotonik NaCl içine 1 ampul ranitidin konularak 10 dakikada iv verilecek.					
3. 500 cc izotonik NaCl (PVC içermeyen infüzyon torbası veya cam şişe) içine paklitaksel konarak 3 saatte verilecek.					
4. 1000 cc izotonik NaCl içine 1 ampul MgSO ₄ ve 1 ampul KCl konarak 1 saatte iv verilecek.					
5. 1000 cc izotonik NaCl içine sisplatin konarak 1 saatte iv verilecek. (Işık korumalı infüzyon torbası ve seti kullanılır.)					
6. 1000 cc izotonik NaCl içine 1 ampul MgSO ₄ ve 1 ampul KCl konarak 1 saatte iv verilecek.					

Hastanın Kullanacağı Destek Tedavileri :					
Kemoterapi başlamadan 30 dakika önce aprepitant tablet yutulacaktır. Aprepitant tablet 2. ve 3. gün de devam edilecektir.					

İLAÇLAR	 KÜR	 KÜR	 KÜR	 KÜR	 KÜR
Tarih					
Kilo / m ²					
Paklitaksel					
Sisplatin					
Destek Tedavi					
Hekim isim / kaşe / imza					
Eczacı					
Hemşire					