

OPTİMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :KT-ŞM-55
	RADYOTERAPİ İLE EŞ ZAMANLI FLUOROURACİL, LEUCOVORİN KEMOTERAPİ ŞEMASI	Yayın Tarihi :15.04.2024 Revizyon No :00 Revizyon Tar.: Sayfa No : 1/1

Hasta Adı Soyadı :			Protokol No :		
Protokole Başlama Tarihi :			Poliklinik No :		
Kilo :	Boy :	Vücut Yüzey Alanı :	Yasaklı Kol: Sağ Sol		
Tanı :		Evre:	Histoloji :		
Alerji : ☐		Diabet : ☐	Hipertansiyon: ☐		Süre : 2 - 4 saat
TEDAVİ PLANI					
Adjuvan : ☐		Neoadjuvan : ☐		Palyatif : ☐	Eş zamanlı : ☐
Protokol İlaçları		Dozu /m ²		Uygulama Günleri	
Leucovorin 20 mg/m ²				1-5 günler	
5-Fluorourasil 400 mg/m ²				1-5 günler gün	
ANTİNEOPLASTİK, ANTİEMETİK VE HİDRASYON İLAÇLARI					
1- 100 cc sf içinde 8 mg Dekort + Avil + panto + Emetril 15-20 dk i.v infuzyon 2- 250-500 cc izotonik NaCl içinde kalsiyum folinat konarak 2 saatte verilecek. 3- 100 cc izotonik NaCl ile damar yolu yıkanacak. 4- 100 cc izotonik NaCl içinde 5-fluorourasil 5 dakikada iv puşe verilecek 5- 100 cc sf ile damar yolu yıkanır.					
Radyoterapi ile birlikte 5 hafta verilecek					
HAFTALAR	1.HAFTA	2.HAFTA	3.HAFTA	4.HAFTA	5.HAFTA
Tarih					
Kalsiyum folinat					
5-Fluorouracil					
Hekim isim / kaşe imza					