

OPTIMED	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :KT-ŞM-58
	SİKLOFOSFAMİD – METOTREKSAT – 5 FLUOROURASİL (CMF) (3 HAFTADA BİR) KEMOTERAPİ ŞEMASI	Yayın Tarihi :15.04.2024 Revizyon No :00 Revizyon Tar.: Sayfa No :1/2

Hasta Adı Soyadı:		Protokol No:			
Protokole Başlama Tarihi:		Poliklinik No:			
Kilo:	Boy:	Vücut Yüzey Alanı:	Yasaklı Kol:	Sağ	Sol
Tanı:		Evre:	Histoloji:		
Alerji : ☐		Diabet : ☐	Hipertansiyon: ☐		Süre : 1 - 2 saat

TEDAVİ PLANI

Adjuvan : ☐	Neoadjuvan : ☐	Palyatif : ☐	Eş zamanlı: ☐
Protokol İlaçları	Dozu /m²	Uygulama Günleri	
Siklofosfamid 600 mg / m²		1. gün	
Metotreksat 40 mg / m²		1. gün	
5-Fluorourasil 600 mg / m²		1. gün	

ANTİNEOPLASTİK, ANTİEMETİK VE HİDRASYON İLAÇLARI

- 100 cc izotonik NaCl içine.....mg deksametazon konarak 10 dakikada verilecek, settenmgampul verilecek.
- 500 cc izotonik NaCl içine **siklofosfamid** konulacak ve 30 dakikada verilecek.100 cc izotonik NaCl ile damar yolu yıkanacak.
- 100 cc izotonik NaCl içine **metotreksat** 5-10 dakikada iv bolus verilecek .
- 100 cc izotonik NaCl ile damar yolu yıkanacak.
- 100 cc izotonik NaCl içine **5-Fluorourasil** 5-10 dakikada iv yapılacaktır.
- 100 cc izotonik NaCl ile damar yolu yıkanır.

İLAÇLAR	 KÜR	 KÜR	 KÜR	 KÜR	KÜR
Tarih					
Kilo / m ²					
Siklofosfamid					
Metotreksat					

5-Fluorourasil

Destek Tedavi

Hekim isim /
kaşe/ imza

Eczacı

Hemşire