

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :HD-FR-809 Yayın Tarihi :01.10.2024
	DİNAMİK BÖBREK SİNTİGRAFİSİ (^{99m} Tc-MAG3) İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU	Revizyon No :01 Revizyon Tar.:28.02.2025 Sayfa No :1 / 3

Hasta Adı-Soyadı : Doğum Tarihi :
Tarih : Protokol No :
Gebelik Durumu :VAR ☐ YOK ☐

GENEL BİLGİLER

Radyoaktif madde kullanılarak yapılan tetkikler, gebelik süresince uygulanmamalıdır. Emziren annelerin tetkik cinsine göre değişen sürelerde ek önlem alması gerekeceğinden, doktorunuzu durumdan haberdar ediniz. İnceleme günü diğer randevularınızı iptal ediniz. İnceleme sonrası gebe ve çocuklardan 24 saat süreyle en az 2 metre uzak durunuz.

- Bu inceleme için aç kalmanıza gerek yoktur.
- İşleminiz randevu saatinizden itibaren yaklaşık 1 (bir) saat sürecektir.
- İncelemeden bir saat önce başlayıp 30 dk öncesine kadar 3 bardak su içmeniz gerekmektedir.
- Görüntüleme öncesinde üzerinizde metal eşya, takı, bozuk para, vs olmamasına dikkat ediniz.
- Varsa hastane dosyanızı, kan tahlillerinizi, ultrason raporunuzu ve böbrek sintigrafisi incelemesi yapıldıysa film/CD lerinizi randevu günü yanınızda getiriniz.
- Testi yaptırmak istemiyorsanız lütfen randevunuzu telefon ile iptal ettiriniz.

Dinamik Böbrek Sintigrafisi (DTPA):

İnceleme için gerekli radyoaktif madde görüntüleme anında size en uygun olan damar yolundan enjekte edilecektir. Görüntüleme yaklaşık 30-60 dakika sürmektedir. Görüntülemeden hemen önce ya da 20. dakikasında gerekli görüldüğü takdirde damar yolu ile bir defa diüretik verilecektir. Bu ilacın verilme nedeni böbreğin boşaltım süresindeki uzamanın anatomik tıkanmaya bağlı olup olmadığını tespit etmektir. İnceleme sonrasında günlük aktivitelerinizi kısıtlamanıza gerek yoktur. Test esnasında kullanılan ajanların çok düşükte olsa alerji yapma olasılıkları vardır.

İŞLEMEN BEKLENEN FAYDALAR:

Tc-99m MAG3'ün yüksek protein bağlanma oranı vardır (%80). Bu bağlanma, glomerüler filtrasyonla atılmasını engeller ve GFR ölçümünde kullanılmaz. Ayrıca tubuler reabsorbsiyona uğramaz ve tamamına yakını tübüler sekresyon ile atılır. Az miktarda karaciğer aktivitesi genellikle görülür. Artmış karaciğer aktivitesi böbrek fonksiyonu bozulmuş kişilerde (kreatinin >2) görülür ve biliyer ekstraksiyonuna bağlı olarak safra kesesi de görülebilir. Böbrek parankimi, pelvisi ve üreter görüntülemesi ile üreter dinamiği ve reflü hakkında bilgi verir.

İŞLEMİN UYGULANMAMASI DURUMUNDA (REDDETME) / ERTLEME KARŞILAŞILABİLECEK SONUÇLAR:

Önerilen sintigrafiyi ertelemeniz hastalığınızın tanısının konmasında ve tedavinin planlanmasında ve takibinin yapılmasında zorluklara veya gecikmelere yol açabilir.

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :HD-FR-809 Yayın Tarihi :01.10.2024
	DİNAMİK BÖBREK SİNTİGRAFİSİ (^{99m} Tc-MAG3) İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU	Revizyon No :01 Revizyon Tar.:28.02.2025 Sayfa No :2 / 3

DİĞER TANI VE TEDAVİ SEÇENEKLERİ(İŞLEM ALTERNATİFLERİ) VE BU SEÇENEKLERİN GETİRECEĞİ FAYDA VE RİSKLER İLE HASTANIN SAĞLIĞI ÜZERİNDEKİ MUHTEMEL ETKİLERİ:

Hamilelik veya hamilelik şüpheniz varsa doktorunuzu mutlaka bilgilendiriniz. Bu durumda sintigrafik çalışmalar yapılamaz. Bebek emziriyorsanız mutlaka bildiriniz. Bebek emziriyorsanız emzirme işlemine tetkikten sonra 24 saat ara verilmelidir. Tetkikten sonra çevrenizdekiler açısından özellikle çocuk ve hamile bayanlardan 1 gün süre ile 2 metreden yakın temasta bulunmamanız tercihen aynı ortamda olmamanız gerekmektedir.

Bölümümüze gelirken tetkik size yapılacaksa yanınızda bebek/çocuk getirmeyiniz.

Randevu saatinden 15 dakika önce, tetkik yapılacak hasta 5 yaşından küçük çocuk ise randevu saatinden yarım saat önce bölüme geliniz.

Nükleer Tıp incelemeleri esas olarak fonksiyonel / fizyolojik bilgi veren yöntemlerdir. Bazı Nükleer Tıp tetkiklerinde fonksiyonel / fizyolojik bilgiye ek olarak anatomik bilgi de verilmektedir. Hastalığınızın tanısı ya da tedavi etkinliğinin değerlendirilmesi amacıyla yapılan Nükleer Tıp incelemelerinin verdiği bilgiyi birebir karşılayacak alternatif yöntem olmamakla birlikte, ön tanı veya tanınıza göre Nükleer Tıp incelemesi dışında uygun olabilecek alternatif görüntüleme yöntemi seçimi konusunda tetkiki isteyen doktorunuzdan bilgi almanız önerilmektedir. Bölümümüzde, meydana gelebilecek reaksiyonlara müdahale yetkinliğine sahip doktor ve sağlık personeli bulunmaktadır. İnceleme veya radyasyon güvenliği ile ilgili sorularınızı Nükleer Tıp personeli ve uzman doktorlar ile görüşebilirsiniz.

Hekimim, yukarıda bahsi geçen tedaviler için oluşabilecek ve muhtemel yan etkiler hakkında beni yazılı ve sözlü olarak detaylı bir şekilde bilgilendirmiştir. TEDAVİYİ REDDETME ve SONLANDIRMA HAKKIM OLDUĞUNU BİLİYORUM.(Tedaviyi reddediyorsanız aşağıdaki boş alana kendi el yazınızla TEDAVİ OLMAYI REDDEDİYORUM şeklinde yazarak imzalayınız) Verilen bu bilgiler ışığında size planlanan tedavilerin uygulanmasını kabul ediyorsanız el yazınızla "OKUDUM, ANLADIM ve ADINIZI SOYADINIZI yazarak imzalayınız.

Hasta Adı Soyadı : Tarih/Saat :

İmzası :

veya

Hasta Vasisi/Yakınının Tarih/Saat :

Adı Soyadı : İmzası :

(Yakınlığı.....)

Tercüman Adı Soyadı:

İmza :

Yukarıda ismi yazılı hasta/ hasta yakınına tarafımdan hastalığı, yapılacak olan girişim, bu girişimin nedeni ve

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :HD-FR-809
	DİNAMİK BÖBREK SİNTİGRAFİSİ (^{99m} Tc-MAG3) İÇİN AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU	Yayın Tarihi :01.10.2024 Revizyon No :01 Revizyon Tar.:28.02.2025 Sayfa No :3 / 3

faýdaları, girişim sonrası gereken bakım, beklenen riskler, girişim için eğer gerekli ise uygulanacak olan tedavi bağı olarak gelişebilecek komplikasyonlar konusunda yeterli ve tatmin edici açıklamalar yapılmıştır. Hasta/hasta yakını girişime yönelik yeterince aydınlatıldığına dair kendi rızası ile bu formu okumuş ve imzalayarak onaylamıştır.

Hekim Adı Soyadı :

Tarih/Saat:

İmzası :