HAFİF VAJİNAL KANAMA YÖNETİMİ

KLİNİK BULGULAR

- Pedin 5 dk. uzun sürede kirlenmesi
- Taze kan , pıhtı yok
- Mukusla karışık

TAM KLİNİK DEĞERLENDİRME

Hikaye: Amenorenin süresi/SAT, kanamanın süresi ve miktarı krampların süresi ve şiddeti, karın ağrısı, omuz ağrısı, ilaç alerjisi

Fizik Muayene: Vital bulgular, kalp, akciğer, batın ve ekstremite muayenesi

Sistemik problem (şok, sepsis vb.) bulguları kontrol et

Pelvik Muayene: Rahmin büyüklüğü ve pozisyonu,düşüğün evresi

Diğer: Serviks ağzında görülen parçacıkları temizle, mümkünse Rh durumunu belirle USG için sevk et

Düşük Tehdidi

- Serviks kapalı
- Hafif/orta şiddette kanama
- Uterus büyüklüğü SAT ile uyumlu

Kaçınılmaz Veya Tam Olmayan Düşük

- Serviks kapalı
- Hafif/orta şiddette kanama
- Uterus büyüklüğü SAT ile uyumlu veya küçük

Tam Düşük

- Serviks kapalı veya açık
- Hafif/orta şiddette kanama
- Uterus büyüklüğü SAT ile uyumlu veya küçük

Gecikmiş Düşük

- Serviks kapalı
- Kanama yok veya çok az
- Uterus büyüklüğü SAT ile uyumlu veya küçük

Yatak İstirahatı

- Kanama artarsa hemen, normalse 10 gün sonra yeniden kontrol

İlk Trimester

- Enfeksiyon bulgusu varsa antibiyotik tedavisi
- Gerektiğinde ağrı kontrolü
- Vakum aspirasyon/D&C

İkinci Trimester

- Enfeksiyon bulgusu varsa antibiyotik tedavisi
- Gerektiğinde ağrı kontrolü
- Uterotonik/Küretaj

HAFİF VAJİNAL KANAMA YÖNETİMİ

Eğer Rahim Perforasyon Bulgusu Varsa:

- Alet karın boşluğuna doğru ilerler,
- Alınan dokular içinde yağ ve bağırsak materyali görülür

Eğer Perforasyon Ve Ya Diğer Komplikasyon Bulguları Yoksa:

- Örneği incele, Aile planlaması danışmanlığı ver,
- Taburcu et

Eğer Tahliye Tam Değilse:

- Antibiyotik başla,
- Uterusu tahliye et(direk gözlemle),
- Oksitosin ver , gözlemle (2 saat gözlemle)
- Eğer laparotomi yapılamıyorsa sevk et

Eğer Tahliye Tamsa:

- Antibiyotik başla,
- Oksitosin ver,
- Gözlemle (2 saat)

Eğer Kanama Durursa:

- Ergometrin ver,
- Gözlemle

Eğer Kanama Durmazsa:

- Laparatomi yapılamıyorsa sevk,

Eğer Kanama Durursa :

- Bir gece gözlem altına al

Eğer Kanama Devam Ediyorsa:

- Sevk et

Eğer Stabilse:

- Ergometrin ver,
- Bir gece gözlemle

Eğer Stabil Değilse:

- Ergometrin ver,
- Bir üst basamağa sevk et