



KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI

PAKLİTAKSEL – KARBOPLATİN
(HAFTALIK) + RT KEMOTERAPİ ŞEMASIDoküman No : KT-ŞM-51
Yayın Tarihi :15.04.2024
Revizyon No :00
Revizyon Tar.:
Sayfa No :1/2

Hasta Adı Soyadı:			Protokol No:	
Protokole Başlama Tarihi:			Poliklinik No:	
Kilo:	Boy:	Vücut Yüzey Alanı:	Yasaklı Kol: Sağ Sol	
Tanı:		Evre:	Histoloji:	
Alerji : ☐		Diabet : ☐	Hipertansiyon: ☐	Süre : 2 - 4 saat
TEDAVİ PLANI				
Adjuvan : ☐		Neoadjuvan : ☐	Palyatif : ☐	Eş zamanlı : ☐
Protokol İlaçları		Dozu /m ²	Uygulama Günleri	
Paklitaksel 70-90 mg/ m ²			1. gün ,8.gün, 15.gün	
Karboplatin AUC (2)			1. gün ,8.gün, 15.gün	
ANTİNEOPLASTİK, ANTİEMETİK VE HİDRASYON İLAÇLARI				
1. 100 cc izotonik NaCl içine 8 mg deksametazon + avil + panto + aloxi + konarak 10 dakikada iv verilecek. 2. 250-500 cc izotonik NaCl (PVC içermeyen infüzyon torbası veya cam şişe) içine paklitaksel eklenerek 1 saatte iv verilir. 3- 100 cc sf ile damar yolu yıkanır. 4- 250 -500 cc izotonik NaCl içine karboplatin eklenerek 1 saatte iv verilir. (Işık korumalı infüzyon torbası ve seti kullanılır.) 5- 100 cc izotonik NaCl ile damar yolu yıkanıp kapatılır. Uygulancak ilaç miktarı: Paksitaksel Karboplatin				
1. Hafta				
2.Hafta				
3.Hafta				
4.hafta				
5.hafta				
6.Hafta				
7.Hafta				

8. hafta

9.hafta

10. hafta

11. hafta

12. Hafta