

	KALİTE YÖNETİM DOKÜMANLARI	Doküman No :KT-ŞM-80 Yayın Tarihi :15.09.2025 Revizyon No :00 Revizyon Tar.:.... Sayfa No: 1 / 1
	İRİNOTECAN (1,8,15,28 GÜNDE) KEMOTERAPİ ŞEMASI	

Hasta Adı Soyadı :			Protokol No :		
Başlama Tarihi :			Dosya No :		
Kilo	Boy :	Vücut Yüzey Alanı :	Yasaklı Kol: Sağ Sol		
Tanı :		Evre:	Histoloji :		
Adjuvan : ☐		Neoadjuvan : ☐	Palyatif : ☐	Eş zamanlı : ☐	
İrinotecan 50 mg /m2			1.gün 8.gün 15.gün /28 günde		
ANTİNEOPLASTİK, ANTİEMETİK VE HİDRASYON İLAÇLARI					
1-100 cc sf içine 8 mg Deksetazon avil - panto - Emetril konarak 15-20 dakikada iv verilecek. 2-Atropin 0.25 sc uygulanacak (diyare olursa) –Doktora haber verilecek. 3-250-500 sf içinde İrinotecan konarak 60 dk infuzyon. 4-100cc sf ile damar yolu yıkanır. Gerekirse Doktora sor Kolinerjik sendromAtropin 1 ampul s.c Diyare için Lopermid başlanabilir.					
KÜR	1.Gün Tarih (1. Hafta)		8. gün Tarih (2 hafta)		15. gün Tarih (3. Hafta)
1.kur					
2.kur					
3. kur					
4.kur					
5.kur					
6.kur					