

**OPTİMED HASTANESİ YENİDOĞAN SPONTAN VENTİLYASYONU SÜRDÜRMEDE YETERSİZLİK BAKIM PLANI FORMU**

| HASTANIN ADI SOYADI:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | TIBBİ TANISI:                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | PROTOKOL:  |            | TARİH/SAAT |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|--|--|
| HEMŞİRELİK TANISI<br>(MEVCUT/ OLASI PROBLEMLERİ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | HEDEF/AMAÇ<br>(BEKLENEN SONUÇ)        | HEMŞİRELİK GİRİŞİMLERİ                                                                                                                                                                                                                                                              |  | 8:30<br>18 | 18<br>8:30 | 8:30<br>18 | 18<br>8:30 | 8:30<br>18 | 18<br>8:30 | 8:30<br>18 | 18<br>8:30 | 8:30<br>18 | 18<br>8:30 | 8:30<br>18 | 18<br>8:30 | 8:30<br>18 | 18<br>8:30 |  |  |  |  |
| <b>Spontan ventilasyonu sürdürmede yetersizlik</b><br><br><input type="checkbox"/> Pnömotoraks<br><input type="checkbox"/> Pnomoni<br><input type="checkbox"/> RDS(<br><input type="checkbox"/> MAS<br><input type="checkbox"/> Asfiksi<br><input type="checkbox"/> Konjenital Anomaliler<br><input type="checkbox"/> Nörolojik hastalıklar<br><input type="checkbox"/> Prematürelilik<br><input type="checkbox"/> Diğer..... | Yeterli ve düzenli solunumu sağlanmak | Solunum durumu tanımlanır ve kayıt altına alınır.                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | Başı yükseltilerek,(45 derece) uygun pozisyon verilir.                                                                                                                                                                                                                              |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | Sessiz,sakin, nemli ve uygun ısıda çevre sağlanır.                                                                                                                                                                                                                                  |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | Endikasyon varsa aspire edilir.                                                                                                                                                                                                                                                     |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | Ağız ve burun temizliği sağlanır.                                                                                                                                                                                                                                                   |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 3 saat aralıklarla uygun pozisyon verilir.                                                                                                                                                                                                                                          |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | -Gerektiğinde küvöz içi oksijen verilecek.bebekte hedefte oksijen satürasyonu sağlayan en küçük konsantrasyona ayarlanır.                                                                                                                                                           |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | Atelektezi ve Diyafragma hernisi olan tarafa yatırılır.                                                                                                                                                                                                                             |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | Diyafragma hernisi olan bebeklere pozitif basınçlı ventilasyon uygulanmaz.                                                                                                                                                                                                          |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | Pnömotoks gelişimi açısından uyarıcı bulgular (aşırı huzursuzluk, desatürasyon, havalanma farklılığı, apexte yer değişimi) takip edilir.                                                                                                                                            |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | Göğüs drenajı olan hastanın ;                                                                                                                                                                                                                                                       |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 1.Göğüs drenaj şişelerinin konumu göğüs seviyesinden 90cm aşağıda yerleştirilir.                                                                                                                                                                                                    |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 2.hastanın pozisyonu nasıl olursa olsun göğüs tüpü bağlantıları bebeğin altında kalmaması,ezilmemesi ve bükülmemesine dikkat edilir.                                                                                                                                                |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 3.Drenaj tüplerin uzunluğu uzun ya da kısa olmamalıdır.Çok uzun tüpler kıvrılır ve bebeğin altında kalırsa drenajı engeller, çok kısa tüpler gerilir ve bağlantı yerlerinden ve göğüs duvarından ayrılabilir.Tüpler gerilmemesi için bantlarla yatağın kenarına tespit edilmelidir. |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       | 4.Göğüs drenaj tüplerinin açıklığının sağlanması için göğüs tüpünden gelen sıvı miktarı izlenmeli,tüplerde tıkanıklık olup olmadığı kontrol edilmelidir.                                                                                                                            |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
| 5.Hava kaçığının engellenmesi için tüplerin bağlantı yerleri kontrol edilmelidir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |
| 6.Sualtı kapalı göğüs drenajının çalışmasının izlenmesi ; şişede bulunan uzun cam tüpün ucu,atmosfer havasının plevral alana geçişini engellemek için 2cm kadar suyun altında olmalıdır.                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |  |  |  |  |



[illegible]

## DEĞERLENDİRME

[illegible]